

DOSEERADVIES POSACONAZOLE

In te vullen door secretariaat laboratorium

Patiënt en staalnummer	LABETIKET	BARCODE ETIKET
Antimycoticum	Posaconazole (1826) ☐ Tabletten ☐ IV ☐ Suspensie	

In te vullen door de prikker

Gewicht		kg
Dosis*		mg
Datum start therapie		/ /
Tijdstip laatste toediening		uur

* Standaarddosering bij tableten/IV: 300 mg/dag

Afname spiegel (max ½ uur voor toediening = dalspiegel)		uur
---	---	-----

In te vullen door microbioloog

Indicatie	☐ Profylaxe ☐ Therapie:
Resultaat 	µg/ml

ADVIES

Streefwaarde voor profylaxe: >0,7 µg/mL

Streefwaarde voor therapie: >1,25 µg/ml

- ☐ Dalspiegel boven streefwaarde. Huidige dosering mag aangehouden worden. Controle spiegel eventueel na 14 dagen in te plannen.
- ☐ Te lage spiegel. Sluit interacties met co-medicatie uit. Tabletten/IV: verhoog de dosis en controleer de spiegel na 7 dagen. Suspensie (zeldzaam): Toediening bij de maaltijd met koolzuurhoudende drank. Indien geen eetlust, eventueel toedienen met voedingssupplementen. Verhoog de dosis indien mogelijk (maximale dosis 4*200 mg door verzadiging absorptie).
- ☐ Te hoge spiegel (>3.5 µg/mL). Sluit interacties met co-medicatie uit. Tabletten/IV: verlaag de dosis en controleer de spiegel na 7 dagen.