

Brussel, 29 september 2015

Betreft: Louse-Borne Relapsing Fever.

Bijlage: informatiefiche Louse-Borne Relapsing Fever.

Beste confrater,

Er werden drie gevallen van louse-borne relapsing fever gemeld onder de vluchtelingen in België. Andere Europese landen, zoals Nederland en Duitsland hebben de voorbije weken dezelfde problematiek gesignaleerd.

Louse-borne relapsing fever wordt veroorzaakt door *Borrelia recurrentis* waarbij de mens als reservoir fungeert; de overbrenger is de kleepluis of lichaamsluis, *Pediculus humanus corporis*.

De personen met deze pathologie waren afkomstig van Eritrea, Somalië of Ethiopië en hadden een tijdlang verbleven in een kamp in Libië. Relapsing fever (terugkerende koorts) kan in de differentiaaldiagnose worden opgenomen voor een patiënt met plotse koorts, pijnen, huiduitslag of geelzucht. Indien de behandeling gebaseerd is op het geven van antibiotica, kan als complicatie daarop een Jarisch–Herxheimer reactie optreden.

Als een geval van louse-borne relapsing fever bij één van uw patiënten werd gemeld, moet dit aan de bevoegde diensten van de deelstaten worden meegedeeld, zodat preventieve maatregelen binnen de gemeenschap kunnen worden getroffen.

In bijgevoegde fiche vindt u alle informatie over deze pathologie, evenals de maatregelen m.b.t. een gedetailleerde behandeling.

Hoogachtend,